

코로나 바이러스 백신 접종 후 예상되는 상황

백신은 여러분을 바이러스로부터 보호합니다.
신체가 면역을 구축하는 과정에서 부작용이 나타날 수 있습니다.

접종 후 일반적인 부작용

주사를 맞은 팔: 통증과 부어오름.

- 증상 완화를 위해: 깨끗한 수건을 차갑게 적셔 해당부위에 덮거나, 팔운동을 통해 팔을 움직이세요.

나머지 몸 전체: 열, 오한, 피로, 두통

- 증상 완화를 위해: 수분을 충분히 섭취하고 옷을 가볍게 입으세요;
의사에게 ibuprofen 이나 acetaminophen 에 대해 문의하세요.

의사에게 문의해야 할 때

대부분의 경우 통증이나 열로 인한 불편함은 며칠 내로 사라집니다.

다음의 경우 의사에게 문의하세요:

- 주사 맞은 부위의 흥반이나 압통이 접종 후 24시간 후에 커지는 경우
- 부작용이 걱정되거나 며칠 후에도 사라지지 않는 경우

유의사항

- 부작용은 일상생활에 영향을 미칠 수 있지만 며칠 내로 사라집니다.
- 대부분의 코로나 바이러스 백신은 2회 접종해야 효과가 생깁니다. 예방 접종 제공자나 의사가 특별히 지시하지 않는 한, 첫 번째 백신 접종 후 부작용이 있더라도 두 번째 백신을 접종해야 합니다.
- 2회에 걸친 예방 접종 후 신체가 면역기능을 갖추기 까지 몇 주 정도가 걸립니다.
- 접종 후에도 계속해서 마스크 착용, 손씻기, 사회적 거리두기를 실시해야 합니다.

2차 접종 예약일: _____ @ _____